

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 60 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 143 (12/79) - 30 MAI 1979

CEREALES

SEPTORIOSES des BLES(et FUSARIOSE)

La situation est très préoccupante dans l'ensemble de la région :

- D'une part, il est à peu près certain que des contaminations ont eu lieu depuis le début de la période pluvieuse qui a commencé le 19 Mai. Mais l'incubation n'est pas encore terminée, et il faut donc attendre encore quelques jours pour voir apparaître les taches sur les deux premières feuilles.
- D'autre part, les traitements sont uniquement préventifs, et il est donc dangereux de trop attendre pour traiter : on risque alors de tomber dans une période pluvieuse, favorable aux contaminations de l'épi, et avec l'impossibilité de pénétrer dans les parcelles.

En conséquence, il est conseillé de commencer les traitements dès que possible dans toutes les parcelles où l'épiaison est en cours.

Employer les produits suivants, en respectant bien la dose/ha pour assurer une efficacité suffisante :

- Bavistine M (4,2 Kg), Blédor 3 (12,5 Kg), Bronx (5 Kg), Bronx T (10 Kg), Carbenzip M (4,2 Kg), Cérébel (3 Kg), Cérétal liquide (2 l), Epidor P (3,7 Kg), Grex TX (3,1 Kg), Peltar (3 Kg), Sandonil M (3,7 Kg), Milcap (4 l.)
- D'autre part, à noter que le Bayleton total a donné de bons résultats en 1978 sur Septoria tritici, mais que son efficacité sur S. nodorum semble insuffisante ; un complément de 2.000 gr. de manèbe est conseillé avec ce produit.

ROUILLES

La situation reste extrêmement saine, et il est inutile de choisir des produits actifs sur ces maladies. Au cas où une attaque tardive se déclencherait, il restera la possibilité d'appliquer un produit spécifique (Bayleton 25, Calixine, Saprol, Rendor) au début de l'attaque.

CECIDOMYIES des FLEURS de BLE

Ces petits moucheron ont actuellement des conditions très favorables à leur activité. Déjà, des cas nous ont été signalés, et nous nous efforçons de faire le point de la situation. Il faut savoir qu'en cas d'attaque, il est indispensable de traiter très rapidement puisque le délai n'est que de 3 à 5 jours environ pour avoir une efficacité correcte. D'autre part, la plupart des produits insecticides sont inefficaces (phosalone, diméthoate, parathion ...). Seuls le fenthion et le fenitrothion (à 500 gr. ha) ont donné de bons résultats, d'autres produits étant encore en expérimentation pour confirmer leur intérêt éventuel (bromophos, thiométon, ...).

7.1.367

En conséquence, nous vous tiendrons informés de la situation par le moyen des répondeurs téléphoniques :

CHARENTE : (45) ANGOULEME 95.81.98 BARBEZIEUX 78.05.87 COGNAC 82.65.43 RUFFEC 31.05.94.-
 CHARENTE-Mme (46) LA ROCHELLE 41.17.11 MARENNES 85.06.00 MIRAMBEAU 49.60.82
 SAINTES 93.13.33 .-
 DEUX-SEVRES (49) PARTHENAY 64.10.94 .-
 VIENNE (49) POITIERS 88.93.00 prochain numéro : 58.47.06
 CHATELLERAULT 21.14.14

/ VIGNE /

MILDIOU-ROIDIUM

La persistance d'un temps favorable fait craindre une sortie importante de taches primaires. En conséquence, le traitement conseillé dans notre précédent bulletin pour les seuls secteurs sensibles, doit être généralisé à l'ensemble du vignoble. En particulier, la protection de type préventive avec des produits classiques devra être appliquée avant la fin de la semaine. De plus, il est impératif d'ajouter un produit anti-oidium à la bouillie, le temps étant très favorable à cette maladie.

VERS de la GRAPPE

Le vol s'amplifie. Attendre un prochain bulletin pour traiter.

GRILLURES de FEUILLES

Dans certains types de sols, des grillures anormales sont observées. Ces dégâts sont sans doute d'origine physiologique (sol, climat ...) et en tous cas les acariens ne sont pas en cause : tout traitement est inutile à cet égard.

/ POMMIERS POIRIERS /

TAVELURE OIDIUM

Le temps continue à être très favorable et le traitement conseillé dans notre précédent bulletin devra être renouvelé dès le début de la semaine prochaine en raison du développement rapide de la végétation.

Ajouter un anti-oidium, cette maladie étant actuellement très virulente. Pour le choix d'un produit très efficace, se reporter à notre bulletin du 11 Mai.

CARPOCAPSE

Le premier traitement dans les zones chaudes de la région (littoral et vallée de la Charente en Charente-Maritime, plaine de Niort en Deux-Sèvres), devra être fait à partir du 5 Juin si le temps reste chaud.

Pour le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
 "Poitou-Charentes",
 1'Ingénieur d'Agronomie :

B. MORIN

Imprimé à la Station le 30 Mai 1979
 Précédente Note : Bulletin N° 142 - 23 Mai 1979
 N° du papier de presse : 535 AD .-